

Doustne leki przeciwkrzepliwe w profilaktyce wtórnej u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi

Oral anticoagulants in secondary prevention in patients with acute coronary syndromes

Bartosz Kopeć, Mateusz Sikora, Tomasz Sroczyński, Andrzej Pawlik

Katedra i Zakład Fizjologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Streszczenie

Obecnie standardem w postępowaniu przeciwzakrzepowym, u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, jest terapia lekami przeciw płytkowymi. Podwójne leczenie przeciw płytkowe z użyciem kwasu acetylosalicylowego i antagonisty receptora P2Y₁₂ zmniejsza częstość nawrotów incydentów niedokrwiennych i poprawia rokowanie u pacjentów z przebyłym ostrym zespołem wieńcowym. Do leków przeciwkrzepliwych należą antagoniści witaminy K i doustne leki przeciwkrzepliwe spoza tej grupy. Leki z grupy antagonistów witaminy K okazały się nieskuteczne w prewencji incydentów niedokrwiennych, ze względu na wysokie ryzyko krwawienia występujące przy ich stosowaniu. Doustne leki przeciwkrzepliwe spoza grupy antagonistów witaminy K charakteryzują się większym bezpieczeństwem i łatwiejszym stosowaniem niż antagoniści witaminy K, co może w przyszłości doprowadzić do ich standardowego stosowania w prewencji wtórnej u pacjentów z przebyłym ostrym zespołem wieńcowym. Problemem pojawiającym się przy stosowaniu terapii przeciwkrzepliwej jest występowanie działań niepożądanych, głównie nadmiernego, patologicznego krwawienia. Artykuł przedstawia przegląd doustnych leków przeciwkrzepliwych stosowanych obecnie w profilaktyce wtórnej u pacjentów z przebyłym, ostrym zespołem wieńcowym oraz tych, które mogą być stosowane potencjalnie w przyszłości. (*Farm Współ 2018; 11: 94-98*)

Słowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy, profilaktyka wtórna, antykoagulanty, dabigatran

Abstract

Currently, the standard anticoagulant therapy for patients with acute coronary syndromes includes administration of antiplatelet drugs. Dual antiplatelet therapy with acetylsalicylic acid and receptor P2Y₁₂ antagonist decreases the recurrence of ischemic incidents and improves prognosis in patients with acute coronary syndromes. Vitamin K antagonists (VKA) seem to be ineffective in prevention of ischemic incidents due to a high risk of bleeding. The recent introduction of non-VKA oral anticoagulants, characterized by a better safety profile and ease of use compared with VKA, has led to a common use of these drugs in a secondary prevention in ACS patients. Excessive pathological bleeding still remains a major problem during anticoagulation therapy. The article presents an overview of current and possible future oral anticoagulant drugs which can be used in the treatment of patients with acute coronary syndrome. (*Farm Współ 2018; 11: 94-98*)

Keywords: acute coronary syndrome, secondary prevention, anticoagulants, dabigatran