

Odbarwienie włosów jako powikłanie leczenia sunitynibem – opis przypadku

Hair discoloration as an adverse effect of therapy with sunitinib – a case report

Katarzyna Sobańska¹, Zuzanna Synowiec², Rodryg Ramlau², Edmund Grześkowiak¹

¹ Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

² Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Sunitynib jest inhibitorem licznych kinaz tyrozynowych o działaniu antyangiogennym i przeciwnowotworowym, stosowanym w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (mRCC, ang. *metastatic renal cell carcinoma*). Częstymi działaniami niepożądanymi leku są zaburzenia dermatologiczne, spośród których charakterystycznym powikłaniem jest zmiana koloru włosów. Artykuł opisuje przypadek 63-letniego pacjenta z mRCC leczonego sunitynibem, u którego zaobserwowano objawy odbarwienia włosów w obrębie głowy, tułowia i kończyn. (*Farm Współ* 2018; 11: 116-119)

Słowa kluczowe: sunitynib, odbarwienie włosów, depigmentacja włosów, działanie niepożądane

Abstract

Sunitinib is an antitumour and antiangiogenic multiple tyrosine kinase inhibitor (TKI), used in the first line treatment of metastatic renal cell carcinoma (mRCC). The common adverse effects of the drug are dermatological disorders including characteristic hair discoloration. The article describes a case of a 63-year-old patient with mRCC who experienced depigmentation of hair in the head, trunk and limbs during sunitinib therapy. (*Farm Współ* 2018; 11: 116-119)

Keywords: sunitinib, hair discoloration, hair depigmentation, adverse effect