

Wczesne rozpoznanie procesów otępiennych – możliwości diagnostyczne

Early diagnosis of dementia

Leszek Bidzan

Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Streszczenie

Możliwość wczesnego rozpoznania zaburzeń otępiennych, szczególnie jeszcze w okresie przed ujawnieniem się wyraźnych objawów klinicznych ma doniosłe znaczenie praktyczne. W opracowaniu przedstawiono w zarysie możliwości diagnostyczne związane z metodami radiologicznymi, biochemicznymi oraz klinicznymi. W chwili obecnej nie ma jednej wystarczająco użytecznej metody wczesnego rozpoznania procesu otępiennego. Najbardziej racjonalną strategią, pozwalającą znacznie zwiększyć dokładność diagnostyczną jest łączenie metod oceny klinicznej, radiologicznej i biochemicznej. *Geriatrics 2018; 12: 91-98.*

Słowa kluczowe: otępienie, wczesne rozpoznanie

Abstract

Early diagnosis of dementia, particularly at the stage when the clinical symptoms first start to arise, has important practical implications. This paper describes currently available methods for the diagnosis of dementia, including radiological, biochemical, and clinical assessments. There is currently no valid method for an early diagnosis of dementia. A gold standard method for the early diagnosis of dementia would combine clinical, radiological and biochemical assessments. *Geriatrics 2018; 12: 91-98.*

Keywords: dementi, early diagnosis