

Agranulocytoza po stosowaniu klozapiny – opis przypadku ***Agranulocytosis after clozapine – a case report***

Katarzyna Korzeniowska¹, Karolina Majewska¹, Magdalena Pawlaczyk²

¹ Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

² Pracownia Neuropsychobiologii, Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wstęp. Agranulocytoza polekowa to rzadkie powikłanie leków przeciwpsychotycznych. Podczas terapii klozapiną diagnozowane jest u około 1% stosujących lek pacjentów, a największe ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego obserwuje się w ciągu pierwszych 18 tygodni leczenia (ok. 80% przypadków). Patomechanizm tej reakcji idiosynkratycznej jest ciągle słabo poznany. **Opis przypadku.** W artykule przedstawiono przypadek wystąpienia tego powikłania u 65-letniego pacjenta leczonego klozapiną z powodu schizofrenii. (*Farm Współ 2018; 11: 188-191*)

Słowa kluczowe: agranulocytoza, klozapina

Abstract

Background. Drug-induced agranulocytosis is a rare complication of antipsychotic drugs. It is diagnosed in approximately 1% of patients on clozapine therapy, and the highest risk of this adverse effect is observed in the first 18 weeks of treatment (about 80% of cases). The pathomechanism of this idiosyncratic reaction is still poorly understood. **Case report.** The article presents the case of this complication in a 65-year-old patient treated with clozapine due to schizophrenia. (*Farm Współ 2018; 11: 188-191*)

Keywords: agranulocytosis, clozapine