

Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na funkcjonowanie pacjenta w rodzinie

The effect of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on the functioning of the patient in the family

Hanna Antonina Kuczyńska¹, Zofia Sienkiewicz²

¹ Studentka kierunku Pielęgniarstwo, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

² Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wstęp. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) ze względu na swój charakter oraz objawy znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie chorego. Przyczynia się do istotnych ograniczeń w życiu pacjenta, znacząco wpływając na jego ocenę jakości życia. **Cel pracy:** poznanie wpływu POChP na funkcjonowanie pacjenta w rodzinie. **Material i metody.** Badania przeprowadzono w okresie od listopada 2018 do marca 2019 roku, pośród 100 chorych, u których zdiagnozowano POChP. W badaniu wykorzystano sondaż diagnostyczny, jako narzędzie autorski kwestionariusz ankiety składający się z 50 pytań, które pogrupowano w kategorie wg wpływu choroby przewlekłej na funkcjonowanie pacjenta w rodzinie (pierwsza grupa – pacjent samodzielny, druga grupa – pacjent potrzebujący pomocy częściowej, trzecia grupa – pacjent potrzebujący pomocy całkowitej). Badani wyrazili zgodę na udział w badaniu. **Wyniki.** Badane osoby określiły stopień zaawansowania POChP jako lekki w 41%. Jakość funkcjonowania fizycznego 1/2 badanych oceniła jako dobre, podobnie ocenia powyżej 40% badanych funkcjonowanie psychiczne i społeczne. W badanej grupie płeć, wiek, miejsce zamieszkania nie ma wpływu na samodzielność życia. **Wnioski.** POChP to schorzenie ludzi starszych, którym towarzyszy wiele chorób współistniejących. Czas trwania choroby niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie pacjenta w rodzinie. *Geriatrics 2019; 13: 83-89.*

Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, funkcjonowanie w rodzinie, osoby starsze

Abstract

Background. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) due to its nature and symptoms significantly affects the daily functioning of a patient. It contributes to significant limitations in the patient's life, significantly affecting his or her assessment of the quality of life. **Aim.** The aim of this study is to understand the impact of COPD on the functioning of the patient in the family. **Material and methods.** The research was carried out from November 2018 to March 2019, among 100 patients diagnosed with COPD. The study used a diagnostic survey and as a tool a questionnaire consisting of 50 questions grouped into categories according to the effect of chronic disease on the patient's functioning in the family (first group – independent patient; second group – patient in need of partial help; third group – patients in need of full-time help). The respondents agreed to participate in the study. **Results.** 41% of the respondents assessed the stage of COPD as mild. 1/2 of the respondents assessed their physical functioning as good. Similarly, psychological and social functioning was assessed as good by more than 40% of the respondents. Among the researched group gender, age and place of residence did not affect the patient's independent life. **Conclusion.** COPD is a disorder of elderly people who are affected by many co-morbidities. The duration of the disease adversely affects the functioning of the patient in the family. *Geriatrics 2019; 13: 83-89.*

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, functioning in the family, older people